



- 수두 예방 및 관리방법 -

학부모님, 안녕하십니까? 댁 내 평안과 건강을 기원합니다.

본교에 수두 환자가 발생하여 학생들의 감염병 예방을 위해 수두 예방 및 관리방법을 안내드리고자 합니다. 자녀의 건강한 학교생활을 위하여 가정에서 참고자료로 활용해 주시기 바라며, 건강관리 및 개인위생수칙을 잘 지킬 수 있도록 지도해주시면 감사드리겠습니다.



<수두 발진>

□ 수두란?

- ▶ 대상포진 바이러스가 원인으로 홍반이 물집으로 진행되는 전염력이 매우 강한 감염병
- ▶ 전염 경로 : 대화 및 기침할 때 튀는 침방울, 물집 접촉

□ 수두의 증상

- ▶ 잠복기는 10~21일(평균 14~16일)이며, 발진 발생 1~2일 전 권태감과 미열이 나타난 뒤 발진 발생 (소아의 경우 발진이 첫 번째 증상으로 나타나기도 함)



□ 수두 확산 방지를 위한 개인위생 실천과 단체생활 예방수칙!



예방접종하기

- ▶ 표준예방접종 일정 준수 및 빠뜨린 접종 완료하기
- ▶ 생후 12~15개월 1회 접종(만3세 미만은 1회 접종 / 만3세 이상은 2회 접종)



개인위생수칙 준수

- ▶ 비누를 이용하여 30초 이상 손을 자주 씻고, 기침이나 재채기를 할 때는 손이 아닌 휴지나 옷소매로 입과 코를 가리는 기침예절을 지켜 주세요.



의료기관 진료

- ▶ 감염병 의심증상이 발생한 경우 다른 사람과 접촉하지 않고 곧바로 가까운 의료기관에서 진료를 받으십시오.



등원 및 등교금지 : 평균 10~21일까지, 모든 물집에 딱지가 앉을 때 까지

- ▶ 집단유행을 막기 위해 감염 환자는 전염기간 동안에는 등원, 등교(학원 등 사람이 많은 장소 포함)를 하지 않도록 합니다.

<출처 : 질병관리본부 / 경기도감염관리본부>

2019년 8월 21일

유 덕 중 학 교 장